

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

DLP25-2-71 152010

PUBLICATION PÉRIODIQUE

EDITION DE LA STATION RHONE - ALPES

(AIN, ARDECHE, DROME, ISERE, LOIRE, RHONE, SAVOIE, HAUTE-SAVOIE)

55, Rue Mazenod — 69 — LYON-3*

Tél. 60-95-87 (Postes 426 et 427)

ABONNEMENT ANNUEL : 25 F

C. C. P. LYON 9431-17
Régisseur Avances et Recettes D. D. A.
55, Rue Mazenod — 69 — LYON-3*

Lisez sur l'enveloppe de ce bulletin le numéro de votre région

1er supplément au bulletin N° 125 de février 1971

22 février 1971

page 5

ABONNEMENTS

Nous devons rappeler à ceux de nos abonnés qui n'auraient pas encore versé leur abonnement au titre de 1971 qu'ils ne disposent plus que de quelques jours pour effectuer ce versement, faute duquel le service du bulletin risque d'être suspendu au cours du mois de mars.

Les conditions d'abonnement (tarif "individuel") sont mentionnées en tête à droite de ce bulletin.

ARBRES FRUITIERS

CLOQUE DU PECHER - Les pluies de la semaine écoulée, courtes et souvent accompagnées ou suivies de vents secs n'ont pu provoquer de contaminations importantes. Si cela n'a pu encore être effectué, un traitement appliqué dans les tous prochains jours mais avant que de nouvelles précipitations importantes interviennent auront encore une efficacité satisfaisante.

MONILIA DE L'ABRICOTIER - Dès maintenant un réchauffement quelque peu prolongé déclencherait un départ rapide de la végétation. Il y aurait alors lieu d'envisager un premier traitement dès que le sommet rouge sombre des sépales serait bien visible au sommet des boutons floraux.

Nous rappelons toutefois que la lutte chimique contre la moniliose ne réalise toute son efficacité que si les sources de contaminations visibles ont été éliminées auparavant.

Cette lutte préventive comporte:

- 1°- le nettoyage des arbres par la taille et la destruction par le feu des rameaux desséchés l'année précédente ainsi que le curetage des grosses plaies chancreuses.
- 2°- la destruction des "momies", fruits desséchés restant sur les arbres à la suite des attaques de monilia de l'année précédente. Cette opération doit concerner non seulement les abricotiers, mais les autres fruits à noyau se trouvant à proximité.

GRANDE CULTURE

CHARANCON DE LA TIGE DU COLZA - Les premières captures ont été relevées dans la Drôme vers le 12 février. On doit s'attendre, si les conditions météorologiques sont alors favorables, (temps doux et ensoleillé, vent faible ou nul) à une recrudescence d'activité de l'insecte et à un dépôt important de pontes dans les premiers jours de mars.

Un premier traitement doit donc être envisagé à bref délai dans la zone Drôme-Ardèche. Dans la partie centre et nord de la Circonscription, il pourra être prévu de 5 à 15 jours plus tard suivant le niveau des températures, mais un bulletin ultérieur précisera les dates d'application pour ces régions.

On utilisera une des formules suivantes (doses en gr. par hectare)

- dieldrine ou endosulfan: 400 gr en pulvérisation, 500 gr en poudrage
- lindane ou parathions: 300 gr en pulvérisation, 400 gr en poudrage
- méthidathion: 300 gr en pulvérisation
- toxaphène ou polychlorocamphane: 4000 gr en pulvérisation, 5000 gr en poudrage.

L'Inspecteur de la Protection
des Végétaux
A.PITHIUD

Le Contrôleur chargé des
Avertissements agricoles
P.LATARD